

特別栽培生産証明書

有限会社篠崎米穀 様

令和元年産しろいし七夕こしひかりの栽培は、下記の農林水産省新ガイドラインによる表示のとおり、特別栽培であることを証明します。

記

〈 JAさが 白石地区 元年産七夕こしひかり 〉
農林水産省新ガイドラインによる表示

特別栽培米	
節減対象農薬	当地比 5割減
化学肥料(窒素成分)	当地比 5割減
栽培責任者	佐賀県農業協同組合 杵藤エリア営農部
住 所	佐賀県杵島郡白石町大字遠江183-1
連絡先	TEL 0952-84-7010
確認責任者	佐賀県農業協同組合 杵藤エリア営農部
住 所	佐賀県杵島郡白石町大字遠江183-1
連絡先	TEL 0952-84-7010

節減対象農薬の使用状況		
使用資材名	用途	使用回数
ヒドロキシイソキサゾール メタラキシル	殺菌	1回 1回
ピリミスルファン フェノキサスルホン	除草	1回 1回
エトフェンブロックス	殺虫	1回

意欲ある生産者が、精魂込めて安全で美味しい米づくりに取り組みました。
どうぞ、ご賞味ください。

佐賀県杵島郡白石町大字遠江183-1
佐賀県農業協同組合
杵藤エリア 営農部

平成31年産 おいしい“しろいし”特別栽培米”栽培しおり (七タコシヒカリ)

JAさが 杵 藤 エ リ ア 白 石
武 雄 杵 島 地 区 農 業 指 導 連 絡 協 議 会

収量目標 = m²当り穂数 × 1 穂粒数 × 登熟歩合 × 玄米千粒量
500kg 400本 75粒 80% 21.0g

栽培上のポイント

- ① 土づくり資材の投入により、地力向上と生産アップに努める。
- ② 健苗移植による早期活着、分げつ差の早期確保に努める。
- ③ 栽植密度60株/坪移植および適切な水管理による茎数確保と倒伏防止に努める。(疎植はしない)
- ④ 有機物の施用により、ブランド米“しろいし”コシヒカリの生産に努める。
- ⑤ 減農薬、減化学肥料栽培による“しろいし”米生産の確立に努める。

作業区	作業内容	作業時期	作業回数	作業日	作業時間	作業量
1	田んぼの準備	4月10日	1回	4月10日	10時～12時	10a
2	田んぼの準備	4月20日	1回	4月20日	10時～12時	10a
3	田んぼの準備	5月10日	1回	5月10日	10時～12時	10a
4	田んぼの準備	5月20日	1回	5月20日	10時～12時	10a
5	田んぼの準備	6月10日	1回	6月10日	10時～12時	10a
6	田んぼの準備	6月20日	1回	6月20日	10時～12時	10a
7	田んぼの準備	7月10日	1回	7月10日	10時～12時	10a
8	田んぼの準備	7月20日	1回	7月20日	10時～12時	10a
9	田んぼの準備	8月10日	1回	8月10日	10時～12時	10a
10	田んぼの準備	8月20日	1回	8月20日	10時～12時	10a

・ 限りある水資源を大切に
・ 収穫後の稲くらは全量打ち込みしよ

七タコシヒカリ

月	日	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
20日	10日	20日	20日	20日	10日	20日	10日	20日
種子播種	播種	播種	播種	播種	播種	播種	播種	播種
種子播種	播種	播種	播種	播種	播種	播種	播種	播種
種子播種	播種	播種	播種	播種	播種	播種	播種	播種

◎土づくり資材

資材名	単位	1aあたり	10aあたり
堆肥	1t	40kg	400kg
石灰	100kg	100kg	1000kg
化成肥料	200kg	200kg	2000kg
有機肥料	20kg	20kg	200kg

◎野菜断地のガス抑制資材

資材名	使用量(10a)	使用時期
ガスキバツ	3~4kg	代か正前に散布し、代か後には水を3~4日溜めておく。
腐カアツツ	10~20kg	代か後水を上げて、水を入水する前に水口から流して、但し、圃場の1/3程度水が入ってから流す。

(野菜断地の残さ等は早めに馴染みを行い)ガス発生抑制に努める。

(施肥基準)

肥料名	成分	10aあたり	100aあたり
化成肥料	ケイ酸カリン	20kg	200kg
化成肥料	ケイ酸カリン	20kg	200kg
化成肥料	ケイ酸カリン	20kg	200kg
化成肥料	ケイ酸カリン	20kg	200kg

※ 割込施肥の場合は、元肥70%程度とする。
 (備考) ① たい肥又はフスマンは2月末までに施用。畝築時、大豆断地前作栽培前に投入。
 ② ケイ酸カリン (又は、シリカサポート) を元肥に施用して、倒伏抑制のため6月1日頃に必ず施用する。
 ③ 肥料は葉色表3.5を基準とし、幼穂長1.5cmを確保してから施用する。

(除草剤)

除草剤名	使用量(10a)	使用時期
カンパシ (4成分)	1kg	移植直後~ノビエ草葉期
キクソクサール (2成分)	1kg	移植直後~ノビエ草葉期

(備考) ① 圃場を浅植及び田面の露出での植植は生育を抑制することがあるので注意する。

(本田防除)

月別	薬剤名	使用量(10a)	対象病害虫
7月(乳熟期)	シロホツホツ	4kg	カメムシ

健苗育苗の目標

区	育苗日数	育苗日数	育苗日数	育苗日数
七タコシヒカリ	120日	180日以内	315日以内	455日
	120日	180日以内	315日以内	455日
	120日	180日以内	315日以内	455日

・ 栽培履歴記帳の徹底
・ 豊かな実りは土づくりから
・ 認証制度に沿った栽培管理の徹底